

เคนมผงยาเสพติดสูตรนรก

นางสาวสุปราณี พันระตัน
นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวการเสียชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นอย่างเป็นปริศนาหลายรายในท้องที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2564 ซึ่งมีพฤติกรรมการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเชื่อมโยงกับยาเสพติดชนิดใหม่ที่มีข้อมูลการแพร่ระบาดในขณะนี้ ที่เรียกว่า “เคนมผง” ที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นนักเสพยาทั้งหลาย



เคนมผง คืออะไร

“เคนมผง” เป็นการนำยาเสพติดหลายชนิดมาผสมรวมกันกับยาเคหรือเคตามีน แล้วนำมาบดรวมกันให้ละเอียดจนมีลักษณะคล้ายนมผง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุน สาเหตุนี้เนื่องมาจากการเคตามีนหาซื้อได้ยากและมีราคาที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้จำหน่ายรายย่อยจึงมีการคิดค้นสูตรใหม่ด้วยการนำยาหลายชนิดมาผสมกันเพื่อลดต้นทุน โดยฤทธิ์ของเคนมผงนั้นจะมีฤทธิ์หลอนประสาทที่รุนแรงกว่า และออกฤทธิ์ยาวนานกว่า โดยจะไปทำให้เกิดอาการหวาดระแวง หากผสมกับยาเสพติดชนิดอื่นที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง จะไปกดการหายใจ ซึ่งถ้าเสพมากเกินไปอาจทำให้เกิดการเสียชีวิต ซึ่งขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปป.ส.) ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังอยู่ในระหว่างตรวจพิสูจน์ชนิดและส่วนผสมของเคนมผงอย่างละเอียด ข้อเสนอพื้นฐานเบื้องต้น พบว่าเคนมผง น่าจะมีส่วนผสม ของสารเสพติด 4 ชนิด ประกอบด้วย




รูปที่ 1 เคนมผง
ที่มา คมชัดลึก

1. เคตามีน หรือยาเค เป็นยาเสพติดที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของผู้เสพยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มนักเที่ยว



ราตรี ลักษณะจะเป็นผงสีขาว หรืออาจจำหน่ายในรูปแบบน้ำ จัดไว้ในประเภทวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 เคตามีนนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ในกระบวนการดมยาสลบ ในรูปยาฉีดเข้าเส้นเลือดหรือเข้ากล้ามเนื้อ โดยมีฤทธิ์สงบประสาท รู้สึกเคลิบเคลิ้ม ระงับอาการปวด ออกฤทธิ์เร็ว ทำให้หลับอย่างตื้นๆ ปฏิกริยารีเฟล็กซ์ของร่างกายยังคงอยู่ และสามารถปลุกให้ฟื้นเป็นปกติได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงนิยมใช้ร่วมกับยาตัวอื่นในกระบวนการดมยาสลบ หรือระหว่างการทำหัตถการทางการแพทย์ที่ใช้เวลาไม่นานนัก

การนำเคตามีนมาใช้เป็นยาเสพติด นิยมในรูปแบบผง โดยการสูดดมผงเคตามีน (snort) ทำให้ออกฤทธิ์ได้เร็วเนื่องจากสามารถส่งผ่านไปยังสมองได้โดยตรง เมื่อเสพเคตามีนจะทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม กระบวนการหาความคิด การรับรู้ และการตอบสนองต่อภาพ แสง สี เสียงเปลี่ยนแปลงไป ร่างกายเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กัน หากใช้เคตามีนในปริมาณมากจะทำให้เกิดการกดการหายใจ และหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการทางจิต ประสาทหลอน หูแว่ว กลายเป็นคนวิกลจริตได้



รูปที่ 2 เคตามีนและสูตรโครงสร้างของเคตามีน

2. ยาไอซ์ ยาเสพติดที่มีการระบาดหลักในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นผลึกใสคล้ายน้ำแข็ง จึงถูกเรียกว่า “ไอซ์” ยาไอซ์มีสารออกฤทธิ์คือ เมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับยาบ้า แต่มีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูง (~98-100%) จึงออกฤทธิ์แรงกว่ายาบ้ามาก นิยมเสพโดยการนำผลึกกลนไฟให้ระเหิด แล้วสูดไอของผลึกที่ได้เข้าปอด การออกฤทธิ์ก็จะผิดกับการเสพยาบ้าที่ใช้ฉีดยา เพราะการสูดควันของยาบ้าจะให้สารหลายอย่างซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมากกว่า ขณะที่การสูดไอของยาไอซ์จะได้เฉพาะ methamphetamine หรือ amphetamine เท่านั้น เมทแอมเฟตามีน มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท จึงทำให้รู้สึกตื่นตัว บดบังความรู้สึกเหนื่อยล้า รู้สึกเคลิ้มฝัน อยู่หนึ่งไม่ได้ นอนไม่หลับ ก้าวร้าวและรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองเกินไป ถ้าเสพในขนาดยาที่สูงยังเพิ่มความต้องการทางเพศ นอกจากนี้ อาจทำให้ระบบประสาทส่วนกลางถูกกระตุ้นอย่างแรง เซลล์สมองจะถูกทำลาย ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าหลังการใช้ยา และพบว่าผู้เสพมีแนวโน้มในการการฆ่าตัวตายในระหว่างการใช้ยา ผลจากการเสพยาเสพติดมากเกินไปขนาดจะทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อเกร็งตัว ตื่นตกใจกลัว ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจชักหรือหมดสติ ระบบหายใจล้มเหลว ช็อกและเสียชีวิตได้ การใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดภาวะโรคจิต เช่นเดียวกับสารกระตุ้นประสาทตัวอื่นๆ เมทแอมเฟตามีนจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1 (ชนิดร้ายแรง) ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522



รูปที่ 3 ยาไอซ์

ที่มา <https://sites.google.com/site/yaseptidsiththichokh/ya-xi-1>

3. เฮโรอีน จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1 (ชนิดร้ายแรง) ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี จากปฏิกิริยาระหว่างมอร์ฟีนกับสารเคมีบางชนิด เฮโรอีนมีฤทธิ์กดประสาทอย่างรุนแรง ออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีนประมาณ 4-8 เท่า และออกฤทธิ์แรงกว่าฝิ่น ประมาณ 30-90 เท่า โดยทั่วไปเฮโรอีนจะมีลักษณะเป็นผงสีขาว สีนวล หรือสีครีม มีรสขม ไม่มีกลิ่น

เฮโรอีน ออกฤทธิ์กดระบบประสาท มีอาการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีอาการขาดยาทางร่างกายอย่างรุนแรงการการเสพเฮโรอีนในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ฤทธิ์ของเฮโรอีนนั้นจะเกิดขึ้นเร็วมากโดยเฉพาะการฉีดเข้าเส้นเลือดและจะออกฤทธิ์อยู่ได้นานถึง 3-5 ชั่วโมง



รูปที่ 4 เฮโรอีน

ที่มา: sites.google.com/site/yasepthid2561/heroxin

4. ยานอนหลับ

ยานอนหลับกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์ (benzodiazepines) ได้แก่ ไดอะซีแพม (diazepam) หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการค้าว่า แวลเลียม (valium) หรือเรียกกันว่า โรเซ่ ตามชื่อยี่ห้อ Roche จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 4 ซึ่งออกฤทธิ์ที่สมองหรือระบบประสาทส่วนกลางมีระยะการออกฤทธิ์ปานกลาง ในทางการแพทย์ใช้ยาชนิดนี้เป็นยากล่อมประสาทหรือสงบประสาท ทำให้จิตใจสงบ ใช้สำหรับรักษาอาการผิดปกติทางอารมณ์ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล โดยมีขนาดของยาที่ใช้เป็น 2, 5 และ 10 มิลลิกรัม


การนำยานอนหลับมาใช้ในทางที่ผิด นิยมนำมาใช้ร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่น เพื่อเสริมฤทธิ์ของยาเสพติดให้มีความรุนแรงยิ่งขึ้น ให้เกิดการมึนเมามากยิ่งขึ้น



ที่มา: diazepamvendor.com/product/diazepam-valium-5mg-roche


สถิติและรูปแบบการตรวจพบเคตามีน

จากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในการตรวจพบเคตามีนในของกลางที่ถูกจับกุมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 พบว่า จากการตรวจพบเคตามีน 695 ราย พบเคตามีนบริสุทธิ์จำนวน 651 ราย (94%) และเคตามีนผสมกับสารอื่นๆ จำนวน 44 ราย (6%) นอกจากนี้ การตรวจพบเคตามีนผสมกับสารชนิดอื่นนั้น จะพบว่าการผสมกับยาไอซ์มากที่สุดถึง 31 ราย รองลงมาได้แก่ การผสมเคตามีนกับยาอีหรือเคตามีนกับคาเฟอีน นอกจากนั้นเป็นเคตามีนที่ผสมรวมกับยาอี จะเห็นได้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รูปแบบของเคตามีนที่ผลิตจำหน่ายมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือมีการผสมยาเสพติดชนิดอื่นร่วมด้วยนอกเหนือจากเคตามีนเพียงอย่างเดียว



ผลการตรวจพิสูจน์เคมผง

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจตัวอย่างของกลางเคมผงโดยสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 9 ตัวอย่าง พบว่า ของกลางส่วนใหญ่มีส่วนผสมของไดอะซีแอมเป็นองค์ประกอบหลักถึง 93-99% และบางตัวอย่างพบเคตามีนเพียง 0.04% และบางตัวอย่างไม่พบเคตามีนเป็นองค์ประกอบ



ที่มา: สก๊อปข่าวเปิดปม 22 ก.พ. 2564 ช่อง Thai PBS

เอกสารอ้างอิง

ศูนย์ข้อมูลกองทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ Available form:

<http://www.correct.go.th/infosaraban64/letter/filepdf/1612327207.pdf>

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักคณะกรรมการอาหารและยา. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยา ice (ไอซ์). [Online]; 2006.

Available form: http://www.nct.ago.go.th/knowledge_drug.html [Accessed 2011 Aug 19]

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่. ข้อมูลเกี่ยวกับยาไอซ์ [Online]; 2007. Available form:
<http://www.drugcare.net/webboard.php?iMMode=preview&iQID=24&iGID=3> [Accessed 2011 Aug
19]